


# UN VALIDO TRATTAMENTO PER LE SMAGLIATURE



*Il Dr. Massimo Re, medico chirurgo, è specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica e competente in Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Laser. Laureatosi nel 1978 all'Università di Milano, dove si è specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, ha lavorato presso le divisioni di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell'Ospedale Niguarda di Milano e di Chirurgia Plastica e Maxillo-Facciale dell'Ospedale S. Gerardo di Monza. Ha perfezionato le sue conoscenze con stage presso illustri Maestri in Brasile, Francia e Italia e con la frequentazione di corsi avanzati di Chirurgia Estetica.*  
[info@massimore.it](mailto:info@massimore.it)

Le smagliature sono simili alle cicatrici, purtroppo molte volte visibili, e si formano quando il tessuto cutaneo, sottoposto a eccessiva tensione, perde la sua elasticità e subisce una lesione dovuta a uno sfibramento del derma e del sottocute. Non dell'epidermide che, rimanendo intatta, lascia trasparire il difetto sottostante. È per tale ragione che non è possibile eliminarle completamente, come spesso in passato è stato millantato da trattamenti miracolosi dimostratisi nel tempo solo speculazioni commerciali, ma ugualmente attraverso le più moderne tecniche di chirurgia estetica è possibile ottenere ottimi risultati per renderle meno visibili, utilizzando le proprietà del laser CO2 frazionato. Le smagliature si possono presentare di colore rosso negli stadi iniziali, per la proliferazione di capillari, o bianco lucido, perché prive di pigmentazione se sono più datate. Si tratta, in ogni caso, di spaccature lunghe e larghe che, al tatto, lasciano sentire l'avvallamento dovuto alla perdita di spessore della pelle. Per rendere meno visibile una grossa smagliatura l'ideale è ridurre



la larghezza, migliorarne il colorito o la pigmentazione e, se possibile, sollevarne la parte profonda per non avvertire più questi solchi. Con il laser CO2 di ultima generazione, detto frazionato, si ottengono tutte e tre le correzioni e attraverso più passaggi laser, assai precisi, si avrà un risultato apprezzabile già dopo la prima seduta. Le

smagliature risulteranno via via ridotte e meno evidenti, fino quasi a scomparire. Si effettua il passaggio del raggio laser CO2 su ogni singola smagliatura e all'interno di essa, attraverso un computer che lo fraziona in tanti piccoli puntini che vengono regolati nel diametro e nella distanza tra di loro. Con il passaggio del laser la pelle si contrae, la smagliatura si riduce, si ispessisce per la stimolazione di nuovo collagene e assume un colorito e una consistenza più simile alla pelle circostante. Le sedute del trattamento laser CO2 delle smagliature sono rapide, indolori (provocano infatti solo un leggero pizzicore) e si effettuano ogni 15-20 giorni senza necessità di anestesia preventiva.